



Labor Praxisklinik Dr. Kübler
Weltenburger Str. 70
D-81677 München

Tel.: +49 (0) 89 189 44 63 0
Fax: +49 (0) 89 189 44 63 29

E-Mail: labor@labor-praxisklinik.de
Web: www.labor-praxisklinik.de

Auftrag / Einsendeschein

Probenentnahme

Datum: _____

Uhrzeit: _____

Kontrolluntersuchung zu Analyse Nr.: _____

Praxisstempel:

Rechnung an Absender: ☐ Rechnung an Patient: ☐

Name des Patienten:

Vorname des Patienten:

Straße:

PLZ:

Gewicht:

Weiblich: ☐

Geburtsdatum:

Ort:

Größe:

Männlich: ☐

Hiermit beauftrage ich Sie, die folgenden Analysen aus der beiliegenden Probe durchzuführen und medizinisch zu begutachten.
Ich bin einverstanden, dass folgende Analysen in o.g. Labor privat abgerechnet und ggf. nicht von meiner Krankenkasse übernommen werden. Unterschrift des Patienten: _____

Mineralien: Elektrolyte und Spurenelemente (2,5 ml Serum ohne EDTA)

☐ Elektrolyte & Spurenelemente

Sonder-Elemente (einzeln ankreuzen)

Na Natrium
K Kalium
Ca Calcium
Mg Magnesium

Li Lithium
Cu Kupfer
Fe Eisen
Zn Zink

☐ **Mn** Mangan
☐ **Cr** Chrom
☐ **Cd** Cadmium
☐ **Pb** Blei
☐ **Al** Aluminium
☐ **Se** Selen

Aminosäure-Analytik (1,5 ml Serum mit EDTA)

☐ Aminogramm (enthält folgende essentielle und semi-essentielle Aminosäuren):

Met Methionin
Ile Isoleucin
Phe Phenylalanin
Trp Tryptophan

Tau Taurin
Val Valin
His Histidin
Arg Arginin

Leu Leucin
Lys Lysin
Thr Threonin
Pro-OH Prolin-OH

Vitamine (1 ml Serum ohne EDTA)

☐ Vitamin A/E

☐ Vitamin D

Immunologische Diagnostik (1 ml Serum ohne EDTA)

☐ Autoimmun-Screening

Cellpredikt®-Test per Real-Time RT-PCR (2 Röhrchen EDTA-Vollblut)

- ☐ mRNA c-Met / ZEB1 / Oct-3/4 Nachweis zirkulierender Zellen mit gestörter epitheliomesenchymaler Transition

Intrazellulärer Erregernachweis per Real-Time RT-PCR* (2 Röhrchen EDTA-Vollblut)

- | | | | |
|------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| ☐ DNA | Borrelia burgdorferi | ☐ DNA | Chlamydia pneumoniae |
| ☐ DNA | Chlamydia trachomatis | ☐ DNA | Epstein-Barr-Virus |
| ☐ DNA | JC-/BK-Virus | ☐ DNA | Cytomegalievirus (CMV) |
| ☐ RNA | SARS-CoV-2 | | |

* Durch die intrazelluläre Bestimmung gelingt nicht nur die Detektion einer akuten Infektion sondern auch der Nachweis von intrazellulär ruhenden Erregern mit u.a. onkogenem Potenzial

Sonstiges

- ☐ NKG2C-Rezeptor (Nachweis des NK-Zell-Rezeptors) (2 Röhrchen EDTA-Vollblut)
- ☐ CRP C-Reaktives Protein
- ☐ Cortisol
- ☐ TSH
- ☐ Testosteron

Klinische Angaben/Diagnose/Fragestellung:

Gegenwertige Therapie:

Weitere Informationen:

Bei weiblichen Patienten:

Besteht Schwangerschaft?

Ja ☐ Nein ☐

Wurde das Blut während der Regel abgenommen?

Ja ☐ Nein ☐